

(100万回接種当たり)

ワクチン名	対象期間	報告頻度	うち重篤
(A) HPVワクチン計		354.7	205.2
サーバリックス	H21.12～R2.9.30	363.0	213.2
ガーダシル	H23.8～R2.9.30	326.8	178.5
(A)/(B)			8.62倍

(B) 主な定期接種ワクチン計		39.6	23.8
DPT(ジフテリア・百日咳・破傷風)	H25.4.1～R2.9.30	99.8	38.9
DT(ジフテリア・破傷風)	H25.4.1～R2.9.30	12.2	2.8
不活化ポリオ	H24.8～R2.9.30	19.6	10.3
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	H24.10～R2.9.30	35.9	23.2
風しん	H25.4.1～R2.9.30	28.5	19.8
麻しん	H25.4.1～R2.9.30	42.4	36.5
MR(麻しん・風しん)	H25.4.1～R2.9.30	26.7	15.1
BCG	H25.4.1～R2.9.30	147.7	37.1
日本脳炎	H24.11.1～R2.9.30	23.2	11.6
13価肺炎球菌(プレベナー13) (肺炎球菌感染・肺炎等を除く)	H25.10.28～R2.9.30	50.4	42.1
Hib	H20.12～R2.9.30	53.1	35.9
水痘	H25.4.1～R2.9.30	23.0	15.4

* 第50回(2020年12月25日)の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の資料に基づく。

* Hibと13価肺炎球菌ワクチンは、それぞれ同時接種からの報告例が多く、双方の報告数にカウントされているため、実際の報告頻度は上記より低いものとなる。